


EXTRACTION - IMPLANTATION

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Ce protocole chirurgical consiste à extraire la dent et mettre en place l'implant dans l'alvéole d'extraction qui est comblée avec un substitut osseux pour limiter la résorption osseuse et maintenir en place les tissus gingivaux dans la même intervention chirurgicale.

Ce protocole n'est réservé qu'à certaines situations cliniques particulières ou il n'y a pas d'infection. Il est notamment réservé au secteur esthétique. Dans certaines situations, il est également possible de mettre en place une dent provisoire vissée sur l'implant dès la fin de l'intervention.

LE TRAITEMENT SE DÉROULE EN 2 ÉTAPES



CE PROTOCOLE PERMET LA MISE EN PLACE DE L'IMPLANT, IMMÉDIATEMENT APRÈS L'EXTRACTION DE LA DENT, UNE COURONNE PROVISOIRE PEUT ÊTRE VISSÉE DIRECTEMENT SUR L'IMPLANT À L'ISSUE DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE.

LE TEMPS DE CICATRISATION DU COMPLEMENT OSSEUX ET DE L'OSTÉO-INTÉGRATION DE L'IMPLANT EST DE 4 À 6 MOIS.

LE DOCTEUR MONCHANIN CONTRÔLE 4 À 6 MOIS APRÈS L'INTERVENTION, L'OSTÉOINTÉGRATION DE L'IMPLANT, AVANT DE VOUS RÉ-ADRESSER À VOTRE DENTISTE AFIN DE RÉALISER LA PROTHÈSE IMPLANTAIRE.



L'INTERVENTION ?

L'intervention se déroule sous anesthésie locale, dans un bloc opératoire, sous des champs stériles, un lambeau de gencive permet l'accès à l'os de la mâchoire. Le chirurgien réalise ensuite l'extraction de la dent. Après avoir extrait la dent, le chirurgien met en forme l'os pour y placer un implant. Ensuite, il utilise un substitut osseux pour combler l'alvéole d'extraction autour de l'implant.

La gencive est refermée par des sutures résorbables si la densité de l'os et la stabilité de l'implant le permet, le chirurgien va réaliser une couronne provisoire directement sur l'implant. Il peut être nécessaire de faire une greffe gingivale pour renforcer la gencive.

Cette couronne provisoire en résine va être directement vissée dans l'implant. Si la densité osseuse ou la stabilité de l'implant ne permettent pas de mettre en place la couronne sur l'implant, celle-ci sera alors collée aux dents adjacentes.

LES CONSEILS PRÉ-OPÉRATOIRES ?

Une ordonnance va vous être transmise par le secrétariat du docteur Monchanin. Pas d'inquiétude, ce geste reste simple, et ne nécessite aucune prédisposition particulière, hormis respecter l'ordonnance remise. Il est important de ne pas solliciter la couronne provisoire.

EST-CE DOULOUREUX ?

La pose d'un implant se fait sans traumatisme. Elle s'effectue sous anesthésie locale dans le bloc opératoire. Vous pouvez reprendre une activité normale dès le lendemain. Un antalgique vous sera prescrit et donné à la fin de l'intervention pour prendre le relais de l'anesthésie.

Il vous sera prescrit des antalgiques et des anti-inflammatoires pour diminuer les suites opératoires.



INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS ?

La principale condition est que le volume osseux et la qualité de l'os de la mâchoire soient suffisants. Ces paramètres sont évalués à l'aide d'un examen par cône beam, réalisé au cabinet. Cependant il est aussi possible d'augmenter le volume osseux à l'aide d'une greffe osseuse (voir **Régénération osseuse guidée**).

La seconde condition pour réaliser ce protocole est que la dent à extraire ne soit pas infectée. Dans certaines situations, il peut être nécessaire de réaliser cette intervention rapidement pour éviter que la zone ne s'infecte et qu'un abcès dentaire provoque une perte osseuse (fracture, fêlure, résorption de la racine...).

Cette technique est en général réservée au secteur esthétique, elle permet de conserver l'architecture des tissus osseux et gingivaux.

QUELS SONT LES BIOMATÉRIAUX UTILISÉS

?

L'alvéole est comblée par un biomatériau d'origine bovine mélangé à l'os du patient. Ce substitut se présente sous forme de particules minérales. Le substitut osseux sert de support aux cellules osseuses afin de régénérer de l'os.

En limitant la résorption osseuse, le substitut permettra le maintien d'une partie des tissus osseux et gingivaux autour de l'implant, directement sur celui-ci. Cette couronne provisoire en résine va être directement vissée dans l'implant.

Le Dr. Monchanin utilise le Bio-oss®
([plus d'informations sur geistlich.fr](http://plus.d'informations.sur.geistlich.fr)).

LA COURONNE PROVISOIRE?

Cette couronne provisoire est positionnée sur l'implant, directement après l'intervention chirurgicale.

Cette couronne est fragile et n'est pas faite pour mastiquer. Elle a pour objectif de conserver une situation esthétique et confortable.

Si la densité osseuse ou la stabilité de l'implant ne permet pas de mettre en place la couronne sur l'implant, celle-ci sera collée aux dents adjacentes.

Une sollicitation trop importante de cette couronne ne permettrait pas l'ostéointégration de l'implant, il est très important de ne pas mastiquer sur cette couronne provisoire pendant 3 mois.



Planning de traitement [extraction - implantation]

