


ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE

Qu'est-ce qu'un éclaircissement dentaire ?

Les praticiens de la Cité Dentaire ont choisi un protocole fiable et efficace sur le long terme. Afin d'agir en profondeur sur la dentine (tissu jaune de la dent) nous utilisons un système d'éclaircissement dentaire ambulatoire. Le produit est laissé au contact de la dent pendant 4 à 6h/jours, grâce au port d'une gouttière transparente. Ce traitement dur 10 à 14 jours selon la teinte initiale de vos dents.



AVANT



APRES



PREMIÈRE SÉANCE ?

Lors de la première séance de 15 minutes le dentiste réalise une empreinte alginate des deux arcades dentaires à éclaircir. Il prendra ensuite la teinte de vos dents afin d'estimer le traitement qui vous sera nécessaire.

Cette empreinte est ensuite transmise au prothésiste qui réalise les gouttières sur mesure en l'espace de 7 jours.

DEUXIÈME SÉANCE ?

Durant le second rendez vous l'équipe de soin vous fait essayer la gouttière et vous fourni le kit de blanchiment. Ce dernier est constitué de seringues de produit prêt à l'emploi, mais dont les concentrations peuvent varier.

Le praticien adaptera cette concentration en fonction de votre situation dentaire personnelle.

Une concentration de 10% (peroxyde de carbamide) sera à laisser agir au minimum 6h/nuit.

Une concentration de 16% (peroxyde de carbamide) sera à laisser agir au minimum 4h/nuit.



ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE

LORS DE VOTRE TRAITEMENT

Afin d'éviter les taches ou de ternir les dents voici une liste de choses pour lesquelles une attention particulière devra être portée (rinçage précautionneux à l'eau) :

- Le tabac (goudron et nicotine)
- Le café
- Le thé
- Alimentation épicée ect.
- Vin rouge

En cas de sensibilité le traitement pourra être espacé à 1 soir / 2 (si les sensibilités persistent, en avertir le dentiste).

Éventuellement les sensibilités peuvent être traitées en remplaçant par un produit fluoré pendant 1 ou plusieurs jours

Les dentistes de la Cité Dentaire utilisent le produit White Dental Beauty 10% et 16%. C'est un système de blanchiment dentaire ambulatoire administré en seringue. Ce traitement doit être contrôlé et supervisé par votre dentiste.

Le produit est présenté sous forme de gel clair, il est aromatisé et composé de peroxyde de carbamide, de gel de peroxyde hydrogène et de concentré de 20% d'eau pour l'hydratation de vos dents.

INSTRUCTIONS

- Ne pas utiliser plus de 1/3 à 1/2 de seringue par arcade
- Se brosser les dents avant de porter la gouttière
- Tapoter légèrement pour adapter les bords de la gouttière contre les dents.
- Après le port de la gouttière, enlever l'excès de gel au doigt ou à l'aide d'une brosse à dent souple
- Rincer deux fois et ne pas avaler l'eau de rinçage
- Nettoyer la gouttière à l'aide d'une brosse à dent propre sous l'eau froide

En cas d'apparition de sensibilité, stopper le traitement et contacter votre dentiste.

PRECAUTIONS POUR L'ÉCLAIRCISSEMENT

- Ne pas utiliser chez les femmes enceintes
- Tenir le gel à l'ombre et à l'abri de la chaleur, ne pas congeler
- Ne pas manger et fumer pendant le blanchiment
- Tenir hors de la portée des enfants
- Eviter tout contact avec les yeux

Planning de traitement [Éclaircissement dentaire]

SOINS (Séance 1)

Prise de teinte et empreinte alginate

7 jours

Réalisation des gouttières personnalisées chez le prothésiste

SOINS (Séance 2)

Remise des gouttières personnalisées et kit de blanchiment

14 jours

Gardez votre gouttière en bouche 4 à 6h selon votre traitement

Séance de contrôle

FICHE D'INFORMATIONS

